



TosTherapy FORTE

JARABE 8 MG/5 ML

ALIVIA EL CATARRO BRONQUIAL
Y LA TOS CON FLEMA

Bromhexina clorhidrato 8 mg/5 ml

Jarabe

Vía de administración oral

Venta directa

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO. CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SU TRATAMIENTO. SI TIENE CUALQUIER DUDA O NO ESTÁ SEGURO DE ALGO, PREGUNTE A SU MÉDICO O QUÍMICO FARMACÉUTICO. GUARDE ESTE FOLLETO PUEDE NECESITAR LEERLO NUEVAMENTE. VERIFIQUE QUE ESTE MEDICAMENTO CORRESPONDA EXACTAMENTE AL INDICADO POR SU MÉDICO.

Composición del producto:

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Bromhexina clorhidrato 8 mg.

Excipientes c.s.: Metabisulfito de sodio; Glicerol; Ácido benzoico; Alcohol etílico 96%; Sorbitol a 70%; Hietelosa; Esencia de mentol líquida; Esencia de cereza líquida; Colorante FD&C rojo N° 40; Ácido tartárico; Agua purificada.

Contenido alcohólico: 4,92% P/V.

Grupo farmacoterapéutico:

Expectorantes, excluidos combinaciones con supresores de la tos.

Indicación:

Indicado para el alivio de la tos producida por estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica o causada por el cigarrillo, asma, enfisema o en tos seca.

¿Cómo se usa TOSTTHERAPY FORTE?

. Adultos y niños mayores de 12 años: 10 ml 3 veces por día (cada 8 horas).

. Niños de 6 a 12 años: ½ cucharadita (2,5 mL) 3 veces al día.

Al comienzo del tratamiento pudiera requerirse un aumento de la dosis, esta se puede elevar hasta alcanzar una dosis total diaria de 48 mg en los adultos.

¿Qué personas NO pueden recibir TOSTTHERAPY FORTE?

Personas con dificultad para expectorar.

Personas con enfermedad del hígado o enfermedad del riñón.

Niños menores de 12 años.

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a la



bromhexina o a alguno de los ingredientes de la

fórmula.

No debe utilizarlo si usted está bajo tratamiento con disulfiram o padece úlcera péptica activa.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar TOSTTHERAPY FORTE?

Antes de usar este medicamento deben evaluarse los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

Es preciso advertir a los pacientes que durante el tratamiento es de esperar aumento de la secreción, lo que puede ser indeseable en pacientes incapaces de expectorar.

Debe usarse con precaución en personas que tengan úlcera gastroduodenal o con antecedentes ulcerosos.


Embarazo: Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

Lactancia: Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

Lactantes y niños: El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

Conducción y uso de máquinas: Durante el tratamiento con este medicamento, en algunas ocasiones se pueden producir mareos, por lo que si se marea no conduzca ni maneje máquinas.





Interacciones medicamentosas:

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Antibióticos (cómo amoxicilina, oxitetraciclina y eritromicina): aumenta la concentración de éstos en el tejido pulmonar. Sin embargo, no se ha demostrado la relevancia clínica de esta interacción.

Antitusivos (anticolinérgicos, antihistamínicos, etc): La administración simultánea de un antitusivo provoca la inhibición del reflejo de la tos y puede causar estasis del moco fluidificado por la bromhexina.

Inhibidores de la secreción bronquial (anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos antihistamínicos H1, antiparkinsonianos, IMAO, neurólépticos). Pueden antagonizar los efectos de la bromhexina.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando TOSTHERAPY FORTE?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, raramente pueden aparecer molestias gastrointestinales (náuseas, ardor) o reacciones alérgicas, como por ejemplo erupción de la piel, edema en la cara, dificultad para respirar, aumento de la temperatura y escalofríos.

No debe ingerirse este medicamento si usted está tomando al mismo tiempo remedios para la tos.

Efectos sobre la capacidad de conducir y el uso de maquinarias: La bromhexina debe ser utilizada con precaución para

conducir y utilizar máquinas en aquellos pacientes que, durante el período de utilización de la misma, hayan observado mareos.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis?

En caso de sobredosis accidental, consulte inmediatamente al médico, aún si no se observa síntoma o signo alguno de intoxicación.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología, llevando el envase del medicamento:

CITUC (P. Universidad Católica de Chile)
+56 22 635 3800

Conservación:

Mantener a una temperatura de no más de 30°C, bien cerrado y al abrigo de la luz.

Presentación:

1 frasco por 120 ml.

**SI EN 48 HORAS LOS SINTOMAS EMPEORAN O NO MEJORAN CONSULTE INMEDIATAMENTE CON SU MEDICO.
NO ADMINISTRAR ESTE PRODUCTO POR MAS DE 5 DÍAS.**

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LO NIÑOS.

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.
Ruta Nacional N° 19, Km 204, El Tío,
Córdoba, Argentina, CP: X2432XAB.
Importado por VIVUNT PHARMA CHILE
LIMITADA. Santa Lucía 330, piso 2°,
Santiago, Chile.
Distribuido por Laboratorio Pharma Isa
Ltda., Colo Colo 263, Quilicura, Santiago.
Reg. ISP N: F-26450/21
Mayor información en www.ispch.cl

1008264

