

**Notts**

**IbuAliv**

**NIÑOS**

Alivio de la  
Fiebre Infantil

Suspensión oral

Ibuprofeno 100 mg/5 mL

Suspensión oral

Vía de administración oral

**Venta directa**

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o Químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

#### ¿Qué contiene IBUALIV NIÑOS?

IBUALIV NIÑOS contiene 2 gramos de Ibuprofeno cada 100 ml de suspensión. Otros componentes de la suspensión o Excipientes: c.s. : Polisorbato 80; Benzoato de Sodio; Aspartamo; Acesulfamo de potasio; Goma xantana; Sorbitol 70%; Ácido cítrico; Glicerol; Colorante FD&C rojo N°40; Saborizante de cereza; Saborizante de banana; Metilparabeno sódico; Propilparabeno sódico; Agua purificada.

#### ¿Para qué se usa IBUALIV NIÑOS?

Calma el dolor, alivia la fiebre y la inflamación. IBUALIV NIÑOS se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y dolor de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

#### ¿Qué personas NO pueden recibir IBUALIV NIÑOS?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al ibuprofeno o a alguno de los componentes de la fórmula. No utilizar además si el niño es alérgico a aspirina u otros antiinflamatorios. Este medicamento contiene acesulfamo y aspartamo como edulcorantes (Ver composición).

#### ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte a su médico:

- Si el niño se encuentra recibiendo otra medicación, presentó problemas o efectos adversos al emplear antiérgicos o antialérgicos.

- Si no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran. Si el dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción de la piel, náuseas y/o vómitos.

- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos; si en el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción, si aparecen síntomas nuevos.

- Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé.

- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos.

- No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.

- No utilizar nunca contra el dolor de estómago o abdomen.

- Usted debe consultar a su médico antes de usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca).

- Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales

#### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos adversos no deseados causados por el medicamento, como trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor de estómago), erupción en la piel con ronchas y/o picazón, alteraciones respiratorias (dificultad para respirar y/o sensación de falta de aire), vértigo y dolor de cabeza. Raramente el tratamiento puede producir alteraciones de los análisis de laboratorio (aumento de enzimas hepáticas), retención de líquidos, y disminución de los glóbulos blancos.

SI EL DOLOR O LA FIEBRE PERSISTEN POR MÁS DE 2 DÍAS O EMPEORA SU ESTADO GENERAL, CONSULTE A SU MÉDICO.

#### Advertencias y precauciones:

Hable con su médico o farmacéutico si usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo "Infecciones").

#### Infecciones:

Este medicamento puede esconder los signos y síntomas de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto, es posible que IBUALIV NIÑOS pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

#### Precauciones Cardiovasculares:

Los medicamentos antiinflamatorios/analgésicos como ibuprofeno se pueden asociar

con un pequeño aumento del riesgo de sufrir un ataque al corazón o un Ictus, en especial cuando se utiliza en dosis altas.

No supere la dosis ni la duración del tratamiento.

### ¿Cómo usar IBUALIV NIÑOS?

Agite el frasco antes de usar.

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Siga las instrucciones de preparación en el cuadro siguiente:

¿Cómo se usa IBUALIV NIÑOS?	
 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>
 <p><b>3</b></p>	 <p><b>4</b></p>

**1** Abra la tapa de seguridad presionando hacia abajo y luego gire en la dirección que indica la flecha.

**2** Coloque la tapa dosificadora en la boca del frasco (este paso debe realizarse solamente en el primer uso).

**3** Inserte el pico de la jeringa en la tapa dosificadora.

**4** Invierta el frasco y extraiga la cantidad de suspensión, según la tabla de dosificación, tirando el émbolo hacia atrás.

Luego de utilizar, cierre el frasco simplemente girando la tapa sin hacer presión. Lave la jeringa dosificadora con abundante agua, seque y guarde en el estuche para la próxima utilización. Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad.

En niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

Peso (Kilos)	Edad (años)	Dosis (ml)
Menos de 11	Menos de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2 a 3	5 ml (1 jeringa)
16 a 21	4 a 5	7,5 ml (1 y 1/2 jeringas)
21 a 27	6 a 8	10 ml (2 jeringas)
27 a 32	9 a 10	12,5 ml (2 y 1/2 jeringas)
Más de 32	Más de 10	15 ml (3 jeringas)

En caso que sea necesario, repetir la dosis cada 8 horas.

No administrar más de 3 veces al día.

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para

aliviar los síntomas. Si usted está cursando una infección, consulte a un médico sin demora, si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

**CITUC Pontifica U. Católica de Chile +562 22 635 3800**

**Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.**

### Información adicional:

#### Condiciones de almacenamiento:

Mantener a una temperatura no superior a 30 °C, lejos del calor y la luz solar directa. Revise regularmente la fecha de vencimiento de los medicamentos. Generalmente, se indica en los envases con dos dígitos que señalan mes y año de caducidad. Expira el último día del mes señalado. Mantener éste y todos los medicamentos alejados del alcance de los niños. Vida útil: 2 años desde la fecha de fabricación.

#### Presentación:

Estuche que contiene frasco de plástico de alta densidad de color blanco, con tapa y sello, conteniendo un frasco x 100 mL.

Ante cualquier duda o consulta puede informarse con: VIVUNT CHILE PHARMA LTDA, Santa Lucía N°330 Piso 2°, Santiago Centro, Santiago.

No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico. No recomiende este medicamento a otra persona.

Revisión: versión 1.0, julio 2021  
1007845

Fabricante y titular del registro sanitario

Elaborado por SAVANT PHARM S.A.

Ruta Nacional N° 19, Km 204, El Tío, Córdoba— CP. X2432XAB Argentina.

Importador y titular del registro en Chile: VIVUNT PHARMA CHILE LIMITADA;

Santa Lucía N° 330, Piso 2°, Santiago, Región Metropolitana, Chile.

Distribuido por: LABORATORIO PHARMA ISA LIMITADA,

Colo Colo N° 263, Quilicura, Santiago de Chile.

Mayor información en [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)

Reg. ISP N° 26.280/21